

Jak się przygotować do badania TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)?

TERMIN

Badania TK wykonywane są bez lub z podaniem środka kontrastującego. Badania bez użycia środka kontrastującego nie wymagają specjalnego przygotowania.

Do badania z użyciem środka kontrastującego pacjent powinien odpowiednio się przygotować.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie.

WAŻNE INFORMACJE



W przeddzień badania należy z zadbać o dobre nawodnienie organizmu, najlepiej wypić dodatkowo 1 litr wody.



Pacjenci chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki wziewne



W wypadku badania z środkiem kontrastującym konieczne jest okazanie wyniku poziomu kreatyniny i TSH



Na min. 4 godziny przed badaniem należy pozostać na czczo (można pić wodę niegazowaną).



Aby zapewnić najlepszą jakość badania, w czasie trwania badania (ok. 5-20 min.) należy pozostać nieruchomo w jednej pozycji.



Na badanie należy przyjść w wygodnej odzieży bez metalowych elementów. Przed badaniem należy zdjąć biżuterię, zegarek, pasek oraz inne metalowe akcesoria.

PRZECIWSKAZANIA DO BADANIA



Niektóre badania wymagają dożylnego podania środka kontrastującego zawierającego jod. Przeciwwskazaniem do ich wykonania są m.in.: ciąża (lub jej podejrzenie), nadczynność tarczycy, niewydolność nerek, alergia na jod czy kontrast.

Zawsze należy poinformować personel medyczny wykonujący badanie o wszystkich swoich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach oraz o ciąży (lub jej podejrzeniu) lub o wystąpieniu powikłań

PAMIĘTAJ! W dniu badania zabierz ze sobą:



- ważny dokument tożsamości
- jeżeli jest to możliwe poprzednie wyniki badań diagnostycznych, laboratoryjnych, wypisy ze szpitala
- w przypadku badania z kontrastem – oznaczony wynik poziomu kreatyniny i TSH (nie starszy niż 7 dni)

Ważne!

- ★ Osoby, które przyjmują na stałe leki powinny je zażyć tak jak zwykle. Wyjątek stanowią Pacjenci chorzy na cukrzycę
- ★ Jeśli podany był kontrast - w okresie 24 godzin po badaniu należy wypić min. 2 litry wody niegazowanej
- ★ Po dożylnym podaniu kontrastu nie zaleca się prowadzenia pojazdów oraz obsługi urządzeń precyzyjnych przez 1 godzinę od ostatniego podania.

Tomografia komputerowa z kontrastem – dodatkowa informacja dla Pacjentów z cukrzycą

Pacjenci chorzy na cukrzycę, ze względu na konieczność bycia na czczo modyfikują przyjmowanie leków na obniżenie glikemii.

- Pacjenci leczeni Insuliną kontynuują podawanie leku wg. dotychczasowych wskazań.
- W przypadku stosowania metforminy może być konieczne jej czasowe odstawienie według zaleceń lekarza. Pacjenci przyjmujący lek zawierający Metforminę, muszą skonsultować się z prowadzącym lekarzem w sprawie modyfikacji leczenia w czasie dwóch dni przed badaniem i dwóch dni po badaniu.

